

## TIPOS DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES: 2005

### Types of Contraceptives in Pregnant Women admitted to Hospital Sergio Bernales: 2005

Carlos Balcázar Nieto 1

#### Resumen

*El presente trabajo se realizó en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales-Collique, del Ministerio de Salud, ubicado en la Av. Túpac Amaru Km. 14.5, distrito de Comas, provincia de Lima, Perú. El estudio es de tipo prospectivo-transversal. Se realizó mediante un cuestionario que constaba de 12 preguntas tipo cerradas. Fue aplicado a 100 mujeres gestantes. Las variables que se utilizaron fueron: sociodemográfica, sociocultural, socioeconómica. El trabajo de investigación duró tres meses. El propósito es conocer, en lo referente a la salud reproductiva en un grupo poblacional determinado, sobre el Método Anticonceptivo (MA) utilizado en este grupo vulnerable para prevenir el embarazo en el futuro. Los resultados: 59% de gestantes usaron el MA, de las cuales el 22% utilizó ampollas. El 34% de gestantes está comprendido entre los 25 y 29 años de edad; el 44% de gestantes piensa utilizar el MA de ampolla y el 8% piensa hacerse la ligadura de trompas. En razón de lo elaborado se tuvo en cuenta el lugar de procedencia. El 28% de gestantes procedían de la sierra y utilizaron un MA con una significación estadística ( $p \leq 0,01$ ).*

*Palabras Clave: Método anticonceptivo-grupo vulnerable.*

#### Abstract

*The following research study took place at Hospital Nacional Sergio E. Bernales-Collique, of the Ministry of Health, located in Av. Tupac Amaru, 14.5 kilometers from the district of Comas, province of Lima-Perú. The present study is a perspective of a transversal type, which was carried out by a survey containing 12 concrete questions applied under social, economic and cultural demographic levels. The duration time of the survey was carried out in a week. The purpose is to know, referring to health, the contraceptive method, using this vulnerable population to prevent pregnancy in the future. The results that we obtain by the survey are: of the 59% of pregnant women that used contraceptive methods, 22% used shots, 34% are 25-29 years old; the 44% of pregnant women will use the contraceptive method of taking shots, 8% will have their tubes tied. Because of the elaborate study we kept in mind the relation to the place of origin, in which 28% of the pregnant women from the sierra region used the contraceptive method and its statistics significance ( $p \leq 0,01$ ).*

*Key Words: Contraceptive method-vulnerable group.*

#### INTRODUCCIÓN

Uno de los principales determinantes en materia de fecundidad en nuestro país, especialmente en zonas urbano marginales y rurales, es la mayor o menor disponibilidad, aceptabilidad y conocimiento del uso de métodos anticonceptivos (MA) más eficaces de planificación familiar así como las aptitudes que tienen las mujeres para planificar su familia.

En el presente estudio se intenta conocer el estado actual de las prácticas de los MA para la regulación de la fecundidad; así mismo se analizan actitudes de fecundidad que influyen en ellos como la carga de una excesiva fertilidad no deseada con sus altos riesgos para la salud de la madre y del recién nacido

(que recae sobre aquellos grupos social y económicamente desfavorecidos porque carecen de información ineficaces o recurren al aborto inducido).

Existe en nuestra población estudiada una necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar entre las mujeres en edad reproductiva que no desea tener más hijos y no están usando MA o los usan muchas veces sin base científica. Esa demanda insatisfecha se concentra sobre todo en las mujeres de bajo nivel educativo. Por otro lado, existe un temor desproporcionado casi siempre injustificado de sufrir "consecuencias indeseables" con el uso de MA.

1 Doctor en Salud Pública. Docente de la Fac. de Obst. y Enf. de la USMP.

**MATERIAL Y MÉTODO**

El presente es un estudio prospectivo de tipo transversal, cuya unidad de análisis fueron las encuestas con respecto al tipo de anticonceptivo usado en mujeres gestantes en el Hospital Sergio E. Bernales – Collique, distrito de Comas, provincia de Lima – Perú. La ejecución del trabajo de investigación tuvo una duración de tres meses, de septiembre a noviembre de 2005.

**Formularios Empleados:** se elaboraron cuestionarios especialmente estructurados con preguntas cerradas dirigidas a mujeres gestantes.

**Recolección de Datos:** las encuestas se realizaron de manera directa en gestantes del centro de salud. Tuvieron un promedio de duración de 10 minutos.

**Significación estadística:** Recolección y tabulación de datos de acuerdo a la relación de las variables elegidas. Hallamos el Valor Esperado (VE) de los datos en relación a las variables elegidas

$\frac{X_m}{t}$  . Desarrollamos la observación (O), valor esperado (E); restamos (O - E). El resultado se eleva al cuadrado y se divide con el (E). El total se suma y se obtiene Chi cuadrado (X<sup>2</sup>).

**MUJERES GESTANTES ATENDIDAS POR EDAD SEGÚN USO DE METODO ANTICONCEPTIVO HOSPITAL SERGIO E. BERNALES – COLLIQUE. 2005**

Tabla 1

Edad	Uso de Anticonceptivo		TOTAL
	SI	NO	
15 -19	3(a)	20(b)	23
20 - 24	15(c)	7(d)	22
25 - 29	23(e)	10(f)	33
30 - 34	11(g)	3(h)	14
35 - 39	5(i)	1(j)	6
40 - 44	2(k)	0(l)	2
<b>TOTAL</b>	<b>59(x)</b>	<b>41(y)</b>	<b>100</b>

Tabla 2

EDADES	NO				
	Obsv.	Esper.	O - E	(O-E) <sup>2</sup>	(O-E) <sup>2</sup> / E
15 - 19	20	9	11	121	13,4
20 - 24	7	9	-2	4	0,4
25 - 29	10	13	3	9	1,4
30 - 34	3	5	-2	4	0,8
35 - 39	1	2	-1	1	0,5
40 - 44	0	0	0	0	0

Tabla 3

EDADES	SI				
	Obsv.	Esper.	O - E	(O-E) <sup>2</sup>	(O-E) <sup>2</sup> / E
15 - 19	3	13	-10	100	1,6
20 - 24	15	12	3	9	0,7
25 - 29	23	19	4	16	0,8
30 - 34	11	8	3	9	1,1
35 - 39	5	3	2	4	1,3
40 - 44	2	1	1	1	1




Figura 1



Figura 2

## RESULTADO

El Hospital Sergio E. Bernales – Collique pertenece al Tercer nivel de Atención del Ministerio de Salud.

De un total de 100 mujeres gestantes estudiadas, el 59% usaron métodos anticonceptivos y el 41% no los usaron.

Con respecto a la proveniencia de la mujeres de la población encuestada, el 25% usó métodos anticonceptivos y era proveniente de la costa, el 28% también usó MA y era de la sierra y el 6% que usó MA era de la selva. El 20% de la población encuestada no usó MA y provenía de la costa. Asimismo, el 20% de la población encuestada no usó MA y provenía de la sierra, mientras que el 1% no usó MA y provenía de la selva; encontrándose una diferencia estadística significativa ( $p < 0,01$ ).

## DISCUSIÓN

En el presente estudio se aprecia que entre la diversidad de anticonceptivos con que contamos hoy, unos tienen mas aceptación que otros, dependiendo quizá de la motivación con que cuenta las usuarias, de los beneficios que el método brinda y también del nivel cultural con que las mujeres posean al momento de decidirse por el uso de uno u otro método. En nuestro resultado, tenemos que en el 53% de mujeres gestantes su estado civil actual es de conviviente a comparación de la investigación realizada por Sonia Camayo Pérez (3). Se obtuvo que el 40,5% de mujeres gestantes son casadas. En nuestra muestra de investigación se obtuvo que el 59% utilizó MA en comparación con el estudio (3) en que se obtuvo que el 59,4% utilizó MA.

Del estudio realizado sobre el tipo de anticonceptivos usado en mujeres gestantes en el Hospital Sergio E. Bernales – Collique, 2005, se ha llegado a la siguientes conclusiones :

- 1.- Del 100% gestantes, el 34% tienen la edad comprendida entre los 25-29 años de edad.
- 2.- Del 100% de gestantes, el 70% reside en el distrito de Comas.
- 3.- Del 100% de gestantes, el 53% tiene como estado civil actual el de conviviente.
- 4.- Del 100% gestantes, el 53% tiene como grado de instrucción el de secundaria completa.
- 5.- Del 100% gestante, el 63% tiene como ocupación actual la de ama de casa.

Así mismo, se encontró que de acuerdo con el grado de instrucción relacionado al uso y no uso de métodos anticonceptivos, encontramos que con educación primaria los usaron el 3% y no los usaron el 1%; con educación secundaria lo usaron el 43% y no lo usaron el 36%, con educación técnica los usaron el 8% y no los usaron el 3%; y superior, los usaron el 5% y no los usaron el 1%; por lo que se encuentra una diferencia estadística significativa ( $p < 0,01$ ).

Se le recomienda al personal de Obstetricia, educar a las mujeres en edad fértil sobre las ventajas y desventajas que ofrece el uso de los MA, dándole la oportunidad de una elección libre e informada; que el equipo de salud en especial las obstétrices elaboren programas con respecto a los diferentes tipos de anticonceptivos; informar a todas las parejas en edad fértil sobre la importancia del uso de los métodos anticonceptivos mediante actividades promocionales en su comunidad. Es necesario profundizar más este tipo de investigación a nivel nacional, siendo el uso de métodos anticonceptivos vital para no traer al mundo hijos no deseados.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Corro Pérez, Marianella Carmen. Aceptabilidad de los métodos anticonceptivos 1987-1990. Prevalencia de los métodos. Tesis para optar el título de Obstetrix. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1992.
2. Marino Panderó, Rosa. Anticonceptivos usados por mujeres en edad reproductiva en el distrito de Masisea- Pucallpa 1991.
3. Camayo Pérez, Sonia Marlene. Estudio sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y tradicionales y las aptitudes de fecundidad en la mujeres en edad fértil actualmente unidas. Puesto de salud de AA.HH. Paraíso. Diciembre-Enero 1991.

## Correspondencia

Carlos Balcázar Nieto: jbalcazar@usmp.edu.pe